




Drs. Concannon & Vitale, LLC

**JOHN CONCANNON, DO, FAAP
COLLEEN VITALE, MD, FAAP**




**NOTE, WE ONLY SPEAK ENGLISH. THIS IS MERELY A
COMPUTERIZED TRANSLATION TO ASSIST NEW PARENTS**

참고, 우리는 영어로만 말합니다. 이것은 새로운 학부모를 돕기 위해 컴퓨터로 번역 한 것입니다.

새로운 아기

에 축하합니다 의 탄생을 새기다!



유아 배려 수 **흥미로운** 고 **쉽습니다!**사 당신의 좋은 심판과 **일반 미**. 을 위해 노력하지 않는 완벽 — 유연하고 그냥 **당신의 아기를 즐길**. 그러나, 많은 문제와 질문 에서 발생하는 시간을 시간을하고있는 화 부모입니다. 이 책자는 대답하고자하는 몇몇 더 자주 하는 상황에서 발생할 수 있습니다 처음 세 달 — 종류 의 빠른 시작 설명서 함께 제공되는 새로운 컴퓨터입니다. 지 — 아 곧 있을 주는 당신 테스트에서 자료 이 책자, 그래서 그것을 읽 **지금**.

그러나, 그것은 것을 의미하지 않는 완전한 소유자의 수동에 대한 귀하의 유아입니다. 많은

가능 책 에 예, 우리는 우리의 요청이 있는 하나 이상에서 손 참조용입니다. **걱정 당신의 아기를 위한 젊은** **아**해 미국소아과학회 아마도 최고입니다. 여성 및 유아도 따뜻한 라인에서 **1-800-711-7011**가 새로운 부모를 요청할 수 있습에 관한 일반적인 질문에 그들의 신생아와 모유 수유 문제입니다.

이 없기로 "완벽하다," 그렇지 않으면 우리는 모두 복제입니다. 그러나, 당신이 통지하는 경우 문제가 있으 새로운 아십시오 그것을 가져올 리관심입니다. 을 얻 언 에서 친구들과 친척은 좋지만 확인해야 우리와 함께 당신이 조언을 얻는가에 대하여 무엇을 느낄 최고입니다. 그냥 다른 사람들, 어린이의 개별 필요하고 원하는 모든 처리에 동 방법입니다. 조부모님이 알고 있어야 하는 많은 일 변경 이후 그들은 그들의

아기들이 있습니다. 할 인용 **소아과** 원본으로 새로운 정보의합니다. 하십시오 알고 있다는 통보로부터 웹 사이트는 잘못 될 수 있습니다 에 적용하기하거나 판매하려고 도구 이 필요합니다.

그래서 당신이 당신의 아기를 알고 더 나은,당신 정기적으로 객실에 당신의 아기와 함께 있는 동안에 병원도 있습니다. 그것은 것으로 나타났습니다 아기들에 숙박 엄마는 병원의 방향이 더 있는 피부 연락,본드는 더 나은,그리고 가슴 먹이 좋습니다. 이 병원은 정기적으로 몇 가지 **혈액 테스트** 모 아기를 확인할 문제는(낮은 갑상선,PKU,etc.). 아시 **의 총 비타민 K** 출혈을 방지하기 위해 문제를 촬영하는 보호에 대하여 **B 형 간염**을 얻 a **청각 테스트** 고 a **심장 질환 테스트**.

먼저 할 일이:이름

직원 될 것입니다 당신을 돕기 위해 작성 **출생 증명서**. A 약간의 시간을 선택하는 이름을 피할 수 있는 몇 가지 놀리 에 대한 특정 조합 이름의하거나 이니셜입니다. 생각 도에 대한 별명입니다. 무엇에 대한 철자가? 인 는 이름 적당하지만 아가지 또한 성인합니다. 이름을 지속 **영** — 그 에 대해 생각하는 가치가있다.

새로운 어머니는 체크인으로 병원들의 **처녀 이름**. 당신의 아기를 들고 다른 이름 알려주시기 바랍 이제 그래서 우리가 할 수 있는 일치 의학 기록합니다. 를 호출해야 합니다 당신 **건강 보험** 회사는 가능한 한 빨리 등록 다. 오 — 고 는 것을 잊지 않을 얻 **사회 보장 번호** 로 가능한 새로운'세금 공제',그리고 다음 설정 **529 대학금**.

A 아 설문조사...HEAD TO TOE

몸체 크기

전체 기간 유아 일반적으로 6~9 파운드에서 중량(2800 4000g),사 18 22 인치 길이(46 56cm)니다. 수있는 아기 일반적으로 **을 잃을** 십분의 탄생에 무게의 첫 번째 주일만, 해를 되찾는 출생에 의해 무게 두 가지 주의 시대입니다. 유아 것입니다 체중에 대해 하나 하나 반에는 온스 일에 처음 몇 개월입니다.

피

아기가 태어나가 두꺼운 치즈 취재 피부라 **태지**. 이것은 씻어에 의해 간호사 후 아기 온도를 조정하여 외부로부 세계합니다. 나중에 아기의 피부를 보일 것입니다 아주 건조한다. 박리 의 피부,특히 손목에이고,발목 모든 영유아에서 발생합니다. 이를 귀찮게 하지 않는 아기 — 그렇지 않도록 그것은 당신을 귀찮게 하니다. **Lanugo** 가 미세한 털이 덮고 일부 유아 떨어지는에서 몇 주니다. 작은 흰색 흑 코 퇴색 달니다. Red 쫓는 표시(**황새 bites**) 눈꺼풀,코,이마 또는 목의 목적 사 년 이상 또는 두 가지입니다. 의

색상 유아의 손가락과 발가락은 종종 청지 순환 성숙한다. 블랙 스페인 아기를 종종 는 밝은 컬러보다는 피부에 자신의 부모;피부 색상 일반적으로 어두워서 몇 일입니다.

을 알 수 있습 노란색 아기의 피부 처음 몇 일 동안의 생명입니다. 이 **황달** 고 발생 아주로 인해 일반적으로 미성숙한 간니다. 일반적으로 모든 노란 색조이 사라졌으로 주의 생명입니다. 는 경우 양 노란색의 색상에서 아기가 더 악화한 후에 당신 아기를 가지고 가정,알려주시기 바랍로 이 가능합니다.

대부분의 아기를 얻을 것이다 **신생아 여드름**발진 뺨에 얼굴 에서 더 나이가 한 달니다. 이 흉터 만 귀찮은 부모님입니다. 그것은 사라질 것이 일주일 그리고 더 크림 또는 로션에 필요합니다. 많 아기는 발진이 보이는 같은 종류의 곤충 물린에서 두 번째는 셋째 날입니다. 이는 발진이지 귀하고 사라질 것이다. 당황하지 마십시오 하는 경우 유아인의 피부는 완벽하지 않습니다 — 아 TV 와 잡지를 광고 실제로 착용 메이크업이다.

리

출생 후에 있을 수 있습 **능선** 따라 두피를 뼈가 헤드의 주위에 이동하는 데 도움이 납니다. 아 머리 수 있습니다 또한 긴 것 또는 **멍** 에 돌아 또는 그것의 측면입니다. 이로 인해 정상적인 프로세스 는 압착에 노동 그리고 배달합니다. 머리는 일반적으로 가 정상적인 모양의 몇 일 이내입니다. 상처가 에서 피부만을 포함하지 않습니다. 이 **소프트 장소** top 의 머리를 덮는 힘든 막고 일반적으로 근접에 의해 올해 또는 두 가지입니다. 될 수 있습니다 **작은 딱지** 에 아이의 머리에서 두피를 모니터링합니다. 이것을 치유에 일니다. **크래들 모자** 노란 비늘에 두피 및 눈섭니다. 는 경우 이 문제가 사용하십시오 작은 경 속종이 현응대사에게 부탁하여 왕 블루 샴푸와 부드러운 칫솔을 부드럽게 스크럽 니다. 또 다시,이것을 귀찮게 부모님보다 훨씬 더 유아습니다.

눈

눈니다 많은 시간, 그들이 보일 수 있습니다 **똥똥한** 고 붉게 여러 가지 일입니다. 때때로 **빨간색 패치** 수 에 보이는 흰색의 안구합니다. 이 때문입 압력의 노동을 해결해주 처리합니다. 눈 것입니다 때때로 보일 **교차** 면 아기가 피곤합니다. **배수 장치** 눈에서 확인해야 하는 경우에 그것은 과도한 또는 남아에 대한 몇 가지 일입니다. 신생아의 비전은 아주 **근시** 초기에,그래서 얼굴을 맞대에서 연락을 8~12 인치 사이 엄마와 아기 도움이 됩니다. 기 전에 그들은 배우 당신의 눈으로 볼 가장 신생아호에 응 의 지역 **대** 같은 사이의 헤어 라인 얼굴입니다. 많 아기는 것을 피하고 다른 어떤 사람보다 엄마 첫째 월 동안,그래서 공격을 하지 마십시오,할아버지입니다.

코

일반 유아주 호흡주 **얇은** 을 위한 간략한 초고,다음 **르** 에서 다른 사람입니다. 을 때 화가는 아기들이 자신의 숨을 몇 초 동안을 저장 큰 소리를 지르시고 운명하다.

모든기 **재채기** 많 — 는 그들이 어떻게 명확한 그들의 코습니다. 의 콧구멍에 아기 코 아주 작은,그래서 조금액 장갑 하는 방법들을 차단 및 그들을 만드는 사운드 정보를 제공하고 있습니다 사 **코 흡인기** (전구 주사기)주어졌기에 병원 정화하는 코의 모든 점액을 방해합니다.

정체되는 경우에는 지속되는 문제로,사용 **염 코 상품**하기 풀고 liquify 점액입니다. 이러한 구입할 수 있습니다 저렴하게(작은 코 및 다른 사람)입니다. 소 네 다섯 아래로 떨어진 하나의 콧구멍,15 초 동안 기다린 다음 **빨** 으로 전구 주사통합니다. 이것을 반복에 다른 측니다. 이 작업을 수행할 수 있습까지 하루에 네 번을 경우 필요합니다. 우리는 우리를 피하려고 다른 의약품 첫 해에는 그렇습니다.

입

요즘 우리는 종종 무시 **혀 관계** 지 않는 한 그들이 문제를 일으킬 에서 통과할 수 있습니다. 아기의 입술도 **빠는 물집**에 그들을 위한 첫 번째 달거나 그렇습니다. 혀는 일반적으로 a **코팅을 희끄무레** 에서 수유합니다. 될 수 있습니다 **화이트 장소** 에 지붕의 입에서 또는 잇몸;이들은 일반적으로 정상적이고 시간이 멀리 갈 것입니다. 만약,나중에,당신은 당신 통보 영구 **흰색 패치** 뺨 및 안 입자 알;이 될 수 있습니다 무성의 효모 불 **구창**.

목

이 시점에서 아기는 매우 약한 목 근육과 을 지원할 수 없습니다. 을 때 당신의 아기를 들고,항상 **지원** 시 고 머리와 함께,팔 손이나 손가락으로 할 수 있습니다.

가슴

일부는 일반 확대 아 **가슴** 인 엄마의 호르몬입니다. 때때로,몇몇 **유백색 출력도** 나의 젖꼭지합니다. 두 가지 조건이 모두 정상적인에서 첫 번째 달니다. 지 않는 짜방지만,우리에게 전화하는 경우 가 있을 것이 증가 또는 적색의 통증 아기의 가슴입니다. 가 종종은 약간의 충돌이 주목하는 의 **유방 뼈**. 이것은 일반적이고 일반적으로 덜 눈에 띄는 시대입니다.

복부

아 **배꼽 버튼 코드** 일반적으로 떨어진 내에서는 첫 번째 두 세 개의 주,그리고 유지되어야 건조까지

다음입니다. 접기 기저귀를 아래 코드를 유지하기 위하여 그것의 젖은 기저귀입니다. **알코올 면봉** 해야에서 사용가능 기본 코드의 하루에 한 번 또는 두 번이다. 이 까지 사흘 후에는 끈 떨어진다. 가 도 **피 배수 장치** 면 코드의 시작을 떨어 는 괜찮습니다. 면 주위의 피부가 빨간색으로 코드 고,열심히 우리의 사무실 바로습니다.

복부(배)벽 주위를 배꼽이 될 수 있는 약한 고 **팽창** 을 때 아기 울음소리합니다. 이러한 탯줄 탈장은 일반 고 일반적으로 닫을 자신하는 동안 첫 번째 년 의 생명입니다.

성기

모두 아기 소녀와 소년은 자주 **부 성기대** 처음 몇 일입니다. 여자 아기가 **흰 배출** 질에서 약 일주일입니다. 때때로 이 수 있습니다 혼합 **드롭 또는 두 개의 혈**다시기 때문에,엄마의 호르몬입니다. 청소할 때는 질 영역을 사용하여 부드러운 수건, 항상 닦아서 **프런트 뒤로** 지 않을 수 있도록 가져올 세균서 직장으로 질니다.

는지 여부를 할레나지 않고,모든 남성 유아야 전달할 수 있는 소변에 **중 강력 스트림**지 스프레이합니다. 할레 받지 음할 수 있는 본질적으로 남 혼자 이 시점에서입니다. 한 달 후,사용 **부드러운** 후퇴에 **포피** 목욕 중에 있다. 포피하지 않을 수 있습이 완전히 풀 다시까지 4~5 년 동안 오래 된다.

따라 산부인과 의사의 조언을 위해 관리 아들의 **할레**. 처음 몇 일 동안은 음경이 나타날 수 있습 raw,빨간색,노란색 껍질니다. 세척 지역 와 물고 부드러운 천으로 세척한 후에는 각 대장 이동합니다. 소량의 **바셀린** 또&D 적용될 수 있을 최고의 음경을 방지하 붙 기저귀한 첫 번째 주거나 그렇습니다.

팔과 다리

신생아들이 긴 **손톱** 는 위협 자신과 다른 사람입니다. 그들이 절단할 수 있습니다 바로 에 걸쳐 가진 아기 손톱이 위면 집에서 병원합니다. 그것은 쉽게 이것을 하는 동안에 영아 잠시 후 먹이다.

모든 영유아 **흔들** 들이 팔과 다리를 때 울고있다. 아기의 다리는도 는 다소 **속고** 에서는 비좁은 분기의 자궁이다. 이 일반적으로 해결에 아이는 성장한다. 가 유아 밀어 다리로 서있는 것처럼,하지 않습니다, 어떤 원인을 악화의 활-레그 상태입니다.

우 시간



신생아 오 갖추고 있을 약관에 동의하는 것으로 호흡,수면,etc., 지 대부분의 것들을 배울 필요가 있을 완성입니다. 아 하는 방법을 알고있을 빨리,하지만 배우 먹을에서 더 효과적으로 각 공급합니다. 지 **인 태어나 어려운 일** — 그래서 아기가 공급되지 않을 수 있습 특히 중 두 가지 일이다. 아기를 알려 그들은 배고픈 울음으로 이동,팔과 다리를 만들고,빨 소음,에 빨는 자신의 손가락이다.

항상 유아에게 안전하게 당신에 가까운 경우 먹이기 — 이 친밀감 이 중요합니다. 지원기의 머리 귀하의 팔꿈치 또는 팔니다.

아아 **준 on demand** 즉,그 때마다는 그녀는 배고픈합니다. 엄격한 먹이는 일정이 필요하지 않습니다 가슴 먹거나 병 먹 유아습니다. 때로는 뉴 아기를 클러스터 공급,여러 시간과 시간,지 나중에도니다. 궁극적으로 아기를 넣을 것입니다 자신에게 일정의 모든 이해 다섯 시간 동안 또는 그렇습니다. 물론,굶주림지 것은 아이가 울고,그래서 확인하십시오 다른 무언가가 있어 열 받은 그 또는 그녀의합니다.

신생아는 없을 것으로 예상 될 수면을 통해 밤과 수로 신생아 실제로 도움이 될 설립이 좋은 모유 수유합니다. 나중에는 박유 는 최고의 수없이 많은 이야기나 재생 그래서 아기는 거기에 **작 자극**. 는 경우에 밤에 먹은 문제 당신은 그것을 찾을 수 있습니다 도움이 깨어 유아에 대한 더 많 자주 낮유를 장려하기 위해 더 이상 자 번습니다.

가슴 먹

모유가 완벽하게 아기를 위해 설계되었습니다. 지 상대적으로 짧은 시간 전에 모든 유아였 가슴 먹습니다. 아무 이유에 대해 염려할지 여부 우유에 올 것이다. 실제로,모든 어머니들은 우유 올에서 기본적으로 일정에습니다. 우유에 있을 작은 금액은 처음에는,그에 따라 달라질 수 있습 물을 크림, 그러나 우유는 여전히 이상적으로 적합한 아기의 에서 필요로 하는 시간입니다.

병원 **간호사 당신을 도움이 될 것입** 기술에서의 유방 먹이 요청하는 경우. 먹이를 먹기 전에 손을 씻 과 당신의 젖꼭지와 물니다. 다음으로 얻 호 위치 중 하나에 앉거나 누워 있습니다.

아기가 **응원 reflex** — 는 경우 당신은 터치 유아의 뺨을 젖꼭지아 자동으로 차례로 머리로 가슴 래치,시작하고 빨니다. 그것은 도움이 되는 아기를 위해 올 얻을만큼의 가능한 어두운 주변 지역 젖꼭지(

문). 눌러야 할 수 있습니다 당신의 손가락을 가슴에 유지 에서 아기의 코 때문에,이 방법 그들은 호흡을하는 동안에 첨부합니다.

당신의 아기에서 간호사 **두 가슴** 에서 각각의 먹이는 시간입니다. 이 첫째 날,시간을 제한하는 3~5 분에서 각 유니다. 점차적으로 작동으로 패턴 **10~15 분에서 각 side**초과의 시작에서 우유를 수유합니다. 90%의 우유에 전달됩니다 이 시간에 의해,그래서 당신 지지 않는 아기가 빨 수 있도록 훨씬 더 길지 않으면 당신하고 싶습니다. 대체하는 가슴 아 피드 에서 첫번째 이후의 아기의 강력한 빨 발생 면 이것은 시작에 불과합니다.

할 때 그것은 당신의 아기를 위한 시간을 정지 간호,삼입 당신의 손가락의 측면에서 입을 깎 흡입니다. 먹이를 먹은 후,당신의 젖꼭지 건조한 공기 10 15 분을 젖꼭지를 단단하게 하고 방지 통증합니다.

는 경우에 당신의 젖꼭지가 되고 있다 **증고**,앉아서나 먹이고 거짓말 아래에 대해 다음입니다. 노 젖꼭지 빛과 공기에 가능한 한 많이,그리고 적용하는 일부 라놀린다. 하는 경우 가슴는 경향이 있을 누설하지 않도록 그들을 덮 젖은 패드에서 사 먹습니다. 피 비누와 알코올 닦음으로 이러한 경향이 너무 건조용입니다.

몇몇 여성의 젖꼭지는 것 같다 **평면** 나 **반전**. 이 수 좌절을 경험한 당신과 당신의 아기 모두입니다. 하나 운동 도움이 될 수 있는가를 부드럽게 꺼내 젖꼭지 롤 손가락 사이의 분 또는 두 가지입니다. 이 할 수 있는 하루에 한 번 또는 두 번전 공급 유아습니다.

거기에 몇 가지 간호 어머니를 할 필요가 있을 도록 적절한 공급의 모유입니다. **피로** 가능한 모든 경우에습니다. 하려고 간호사의 유아용 객실 수 있는 육체적으로 여유를 즐 감정적이다. 의 증가 유동 를 요구하려고, **음료 하나는 유리의 물** 매번 당신은 가슴 먹습니다. 당신은 계속해야를 취할 **비타민** 는 시간 동안 당신 수 간호 유아,칼슘을 섭취, 같은 6~8Tums® 습니다. 간호 할 수 있습니다 어머니는 일반적으로 먹는 모든 음식에 동의 그녀입니다. 그러나 몇 가지 가스가 가득 찬 음식에서 당신의 다이어트를 만들 수 있습니다 가스가 가득 찬 아 **피 양배추,브로콜리,양파**하고,다음과 같습니다. 커피와 초콜릿야 할 수 있습니다 제한됩니다. 지 균형식으로 충분한 단백질과 칼슘을 섭취 필수적이,당신은 없을 많이 마시는 우유 생산 우유를 많이다. 몇 가지 모유를 먹는 아기를 보 에 민감한 소의 우유 단백질이 전달 을 통해 엄마의 모유입니다.

는 경우에 **약물** 는 시간 동안 당신은 당신 가슴 먹이는 의사와 상의하시기 바랍니다.니다. 가 일반적인 약물과 같은 항생제는 자,심지어 하지만 어떤 면으로는 모유입니다. 의 참고,새로운 증거를 보여주는 흡연

또는 섭취하는 모든 마리화나 (THC)에 있는 동안 제품 임신 중이거나 모유 수유 확실히 유해 아기의 뇌 개발합니다. THC 발견될 수 있는 모유에 대한 적어도 6 일 후에 어머니 마리화나를 사용하는지,그렇게 를 사용하지!

당신이 원하는 경우를 공식으로 보충하는 것이 좋 기 두 세 가지 주도록 완전히 우유에 와서입니다. 보 유할 수 있습이 주어진 다양한 이상한 시간 편의 술,또는 면에서 매일 같은 시간, 아마도 오후 6 시,하자 아빠가 알고 아 더 나은입니다.

독점적으로 가슴 먹이는 아기 개월 을 받아야 **비타민 A,D,C,plus 철**의 형태와 PolyViSol 철 삭제나 다음과 같습니다.

유해할 수 있는 때때로 실망하고,많은 어머니 필요할 수 있도록 도와줍니다. 는 경우 하는 데 문제가 있 문의하십시오 병원 간호사, 귀하의 산부인과,기(수유) 컨설턴트,또는 친구가 성공적으로 가슴 먹습니다. 거기에 몇 가지 좋은 책에 이와 같은 항목 *A 가이드는 어머니의 모유 수유*로 여자 유아 병원, **이 여자 예술의 모유 수유**에 의해 LaLeche 리그,또는 **간호 귀하의 아**카렌 프라이어입니다. 포기하지 않는 경우 당신이 정말로 원하는 가슴이 먹습니다.

공식 공급



유아 식,그리고 다른 사람 모델은 가슴 우유입니다.거기에 몇 가지 주요 브랜드 같은 Enfamil 고 Similac 뿐만 아니라 여러 가지 일반 브랜드의 공식 등 부모로 선택,대상 등이다. 는 경우에 WIC 프로그램입니다. 어떤 수식은 당신에게 제공해 그들이 수락가능합니다. 으로 2017 년 로드아일랜드에서는 이 수식 은 Similac 니다.

일반 우유 **지 적합** 음식으로틀 위한 아기들이 있습니다. 사 단점의 우유가 너무 많이 소금과 미네랄과 비타민의 부족,철,그리고 적절한 단백질이다.

유아 공식 모두에 올 **일정 고 부드러운** 종류가 있습니다. 우리는 일반적으로 추천 일정 지 거기에 몇 가지 문제를 만드는 것 또는 부드러운

공식 더 나은 대안이 — 러 감성 우유,가혹한 복통이거나, 다음으로만 우리의 특별한 추천서입니다. 모 필요한민에 포함된 이러한 수식니다. 이러한 모든 유형의 수식은 완벽하게 건강한 귀하의 유아,우리가

사용하는 것이 좋습 중 하나 또는 다른 까지의 유아는 하나의 세습니다. 기 오염 문제에 우리가 하는지 조연을 구입식 제조되는 외국에서,중국과 같습니다.

유아 공식만에 올 **높은 철분**다양한다. 할머니는 주장 할 수 있습니다 아기가 변비나 산에 높은 철,하지만 연구를 나타내지 않는 그렇습니다. 아기를 빠르게 성장하는 그들은 **해야에 높은 철분** 콘텐츠 빈혈을 방지하기 위해서 나중에습니다.

의 유형식,급식 또는 분말, 에 차이 영양을 공급합니다. **Ready-to-공급** 은 더 편리한 경우 여행을하지만,훨씬 더 비싸다. 단순히 직접 붓 병으로 먹습니다.

유가 모두 편리하고 더 적은 비싸고,더 이상 shelf-life. 따라 방향의 측면에 할 수 있습니다. 사용 특 매장 내부의 수 있습의 분말,과 추가 정확한 금액의 차가운 탭 물을 각 scoopful 의 분말,흔들기,그 다음 가열합니다.

불 에이즈 치아를 개발하고의 예방은 치과 구멍입니다. 더 섭리는,지역 그림니다 물 공급에서 **스 시츄에이 저수지**은 불에 추가한 물입니다. 가장 잘 물,일반적인에서는 사우스 카운티,하지 않습니다. 는 경우에 귀하의 물 공급을 포함하지 않는 불화물,요청 처방을 위해 불화물이 6 개월을 방문합니다. 는 경우 당신은 특정,통신의 도시 물 공급을 보거나, 치과 의사에게 문의합니다. 식 또는 젖은 90 %물이 어쨌든,그래서 당신은 정말 필요가 없을 제공하는 추가 물니다.

열

할 **따뜻 병** 몸의 온도에서 팬의 뜨거운 물,사용하거나 병이 따뜻한 있습니다. 유아 젊 일반적으로 선호하는 몸의 온도는 수식은,하지만 객실 온도가 수락 가능하다. **를 사용하지 않는 전자 레인지** 열기 병는 수식으로 나올 수 **끓는 뜨거운**도 멋진-터치 병합니다. 또한,인스턴스가 발생한 '핵 공격'용기가 폭발할 때 꺼내어 주어진다.

살균

는 동안 물로드 아일랜드에서 깨끗하고 건강, 식 분말 자체가 될 때때로 오염 된다. 그렇다면,필요한 지시사항을 따르십시오 살균와 함께 제공되는 공식입니다. 병해야 히 세척 뜨거운 비누 물고 병,브러시나 를 사용하여 자동 식기 세척기 등을 제공합니다. 그것은 매우 하지 않는 것이 중요하자 공식을 한 번에 서 실내 온도보다 더 **시간**.

먹이기

의 양식 신생은 각 공급 에 따라 다를 것입니다 **나 네 온스**. 면 아기는 끝을 모두 제공하는 하나 하나를 추가 온스 다음니다. 면 병을 먹고,항상 있는지 확인 젓꼭지아 **의 전체** 식지기입니다. **결코 버팀대** 병에서 아이 입니다. 을 기억하는 유아야 합 지원 의 친밀감에 개최되는 안전하게 당신의 팔에습니다.

젓꼭지

젓꼭지는 다양한 크기와 모양의;무엇을 하나의 베 을 선호하는 또 다른되지 않을 수도 있습니다. 을 때는 젓꼭지 구멍에 대 오른쪽 크기,따뜻한 수식 **립 밖으로 빠르게**지 하지 않고 스트림니다. 는 경우에는 구멍이 너무 작고,또는 가 막힌 아기는 쉽게 타이어나 빨 너무 많 공기 위합니다. 당신이 시도할 수 있습을 확대하여 구멍 를 사용하여 **가열 pin**니다. 는 경우에 젓꼭지에 구멍이 너무 크고,다른 한편으로, 수있는 아기 질식에 너무 많은 공식이다. 병 젓꼭지 만 좋은 몇 주 동안 또는 그렇게 시작하기 전에 이들을 타락한다. 는 경우 그들은 거미도 그들을 끓는 가 pinch of salt.

저녁 식사 후 힌트

고무 젓꼭지

빠는 것은 때로는 더 중요한 유아보 먹는다. 만족하는 본능 아이에 빨 그들의 손,손가락,및 다른 사람들이 찾을 수 있습니다. 일단 당신이 당신 히는 모유 수유,많은 유아 찾기 고무 젓꼭지 유용한 대안입니다. 좋은 소식입니다 증거가 있다는 속도의 SID(갑작스런아 죽음을 증후군)미만에서 젊은 유아를 넣어 잠 고무 젓꼭지합니다. 그러나 거기에는 또한 몇몇 증거가 는 경우에 젓꼭지 사용의 나이 12 개월 동안,아 도 높은 평가 귀 감염의합니다.

고무 젓꼭지에는 여러 다양한 크기와 모양입니다. 일반적으로, **한 조각** 고무 젓꼭지를 선호하는 사람들의 다양 구성 요소는,,거의 떨어져 오니다. 가장생 어려움 들고에 젓꼭지에서 첫 번째는,그래서 작은 엄마 또는 아빠의 도움에 감사하면 아기를 보인다 을 즐길 수 있을 빨아들이는입니다. **지 넥타이** 젓꼭지의 주위에 아기의 목기 의 위험이 되 교 살니다. 하려고 깨우 아동 장치에서 될 수 있습니다 어려울 수행하지 않을 경우 중 하나에 의해 올해합니다.

트림

는 경우에도가 올바르게 공급,두 병을하고 가슴 먹이기 **삼기기**. 는 방법을 제거하는 이 공기 거품에서 위로 트림이다. 을 잡고 똑바로 아기가 어깨에 두드리거나 문지르기까지 성공적이다. 할 를 사용에 충분한 부력을 때 트림을 **을 만들 쿵**가 당신의 컵이 손을 얻을 것이다 거품이 공기의 올니다. 또는,당신이 시도할 수 있습 트림 유아 앉거나 누워 있는 얼굴 아래에서 당신 랩니다. 그것은 아늑 항상 필요한 인터럽트는 먹이

트림 아기는하지만, 일부 유아지면 더 나은 트림 적 몇 온스입니다. 물론, 때로는 유아용할 필요가 없 트 모두에서, 그래서 그것을 강요하지 마십시오. 후 먹이고 트림, 유아용 침대에 시.

딸꾹질

모든 아기 히킵이 자주합니다. 일반적으로 이 없 사람을 귀찮게 하지만 부모로, 유아 자주 보인 **완전히 인식** 의 딸꾹니다. 딸꾹질은 자연의 방법 운동을 호흡 근육의 아기합니다.

뱀

모든 아기 침 가끔합니다. 다상 화나게 부모님보다 자식이다. 면 구토 발생합니다, 우유 위에서 자주 나오 모두 **코 고 입**. 이러한 경우에는 것이 도움이 될 수 있을 사용하여 코 흡인기(**전구 주사기**) 을 빨아 모든 남아있는 우유 콧구멍에서, 그래서 는 아은 더 쉽게 호흡할 수 있습니다. 가 중요한 요소는 당신의 유아는 남을 만족 그리고 성장을 계속하고 잘합니다. 구토 발생시 정기적으로 또는 강제로 연락을 주시기 바랍니다.

는 아기를 위해 자주 'spitters,' 우리가 추천 이러한 구제입니다. 피드 **작은 금액** 더 자주로 을 방지 위의 과부하입니다. 트 아기 때 두 온스, 또는에 전환할 때에 하나의 가슴을 다룬다. 유아의 장소에서 **자동차 시트** 위치 15 분 내지 20 분 가량 휴지시 후 먹이다. **올리 머리** 의 침대 매트리스에 의해 약간 를 배치 베개 아래에 에서 매트리스 침대 프레임입니다. 마지막으로, 당신은 수 있습을 사용하여 시험 **클러식** 온도니다.

고체

아기만 필요하 모유 또는 공식에 대한 첫 번째 몇 개월입니다. 아 **할 수 없** 좌표 자신의 방언을 제비를 위한 고체에서 이상 세 개월. 수 있다는 말을 들었을 시작 고체의 것이 아기를 허용 밤 앞에서 연구에 이렇게하지 않습니다. 무엇에도 불구하고 할머니, 우리는지 조언을 시작하는 고체까지 4 6 개월의 나이를, 그리고 그 다음 논의 후에 그것을 니다. 우리는 당신에게 더 많은에 대한 조언을 할 때 시간 온습니다.

에 어떤 일이 일어나 밖으로 나와야



변

아기의 첫 번째 장의 움직임은 끈끈한 그린 블랙 소재 불 **태변**니다. 며칠 후에 그들은 가볍고의 조합을 만들 수 있습니다. 이 변 변화에 탄력에서 잘 형성했습니다. Breast-fed 유아 나중에 일반적으로 변 설명 으로 "물 계란을 스크램블." 아기는 일반적으로 수 어디에서나 모든 3 4 일 6 회 날입니다. 의 색깔이 변할 수 있는 노란색, 녹색, 또는 브라운다.

아기 돌 수 있습 빨간색과 소란 모든 장 이동,또는 보일 수 있는 완전히 그들을 인식하지 못합니다. 모든 위의 상황을 수 있습니다 **일반**.

아기 변경의 오염으로 기저귀 **신**. 모든 기저귀 장비에서는 때에는 손으로 당신 시작합니다. 기억 **지 아기를 두 무인** 에서 변경 테이블으로 이것은 종종 그들은 먼저 배우 롤 상 —바닥에, 불행하게도니다. 처분할 수 있는 닻은 경우에 좋 당신의 아기를 허용하지만,모든하지 않습니다. Unscented 닻은 아마 더 나은 당신의 자녀가 민감합니다. 장소는 오염 기저귀로 기저귀 지 또는 쿼트 크기 **플라스틱 지퍼 부대** 을 방지하 약취합니다.

변비가 현재 때 변 닻은 하드토 자갈입니다. 온화한 변비에서 젊은 유아에 의해 도움이 될 수 있습 제공 온스 또는 두 개의 사과 주스 또는 화이트 포도 주스입니다. 를 사용하지 않는 관장,좌제 또는에서 완하제 신없이 의사의 방향이다.

설사가 현재 때 변의 큰 거래를 포함 물 는 젖을 통해 기저귀입니다. 우리에게 전화하면 당신의 신생아 아기는 비정상적으로 잦은 느슨한 설사를 변 경우,또는 설사 지속 넘어요.

기저귀 발진

을 변경하는 경우에도 기저귀 일부는 자주 발진 발생할 수 있습니다. 바셀린,Desitin,&크림은 D 자주 사용되는 아기를 보호하기 위해 피부서 의 자극을 변 및 소변입니다.

당신의 아기는 문제가 발진 기저귀는 우리 것이 좋 당신 **을 떠나 기저귀 룩** 만큼은 합리적인 순서 공기 건조한 지역이다. 때때로 **자르는 탄력적인 수집** 주변 다 구멍을 허용할 것이 더 건조 공기 때 아기가 고에 대해합니다.

복통

이것은 가장 귀찮은 조건에 대한 어떤아 사 **주 고 세월**의 연령입니다. 솔직히 말해서,우리가 정말로 알지 못하는 이유기 가 복통을 경험한 다른 사람이 없습니다. 당신은 시간을 선택할 수 있는 공격의 거의 모든 저녁(거나 하루 종일) 으로 구성된 돌기의 얼굴에 빨간색,그릴 다리,그리고 비명 소리입니다. 부르짖는 일반적으로 꽤 다른 사용에 대한 배고픔이나 가벼운등을 예방할 수니다. 울음을 그치지도 아이 집어 와 위로 받고 있으므로 갑자기 그것은이 시작됩니다. 이 위도 럼블 및 그것은 것처럼 보일 수 있습니다 아기가 배변을 전달합니다. 다른 시간에 하루의 유아용 보일 수도 있고 행복한다.

이 거의 없는 부모가 할 수 있는 제외하고는 **편안함 아기** 까지 공지합니다. 는지 확인하기 다만 배고픈,젖은,또는 외롭습니다. 아기를 잡아 당신에게 가까이 도보로 당신은 당신의 주위에 있습니다. 또는,잡고 아기에 그 위에 무릎을 꿇고 부드럽게 진동 당신의 다리합니다. 자동적인 아기 변화하는 경향이 있을 제공 짧은 전환합니다. 고무 젓꼭지,soft music,dim lights, 흔들 의자,아기 운반 장비, **자동차 놀이기구** 수도 있습은 모든 수도 변수 성공합니다. 의 아이 주변 당신과 함께 자주 하루 동안입니다. 당신을 망칠 수 없 아기 의를 들고 그들에게 너무 많은 상반기에 올해합니다. **싸** 아기의 상체(hips)로 얇고,빛 담은 종종 복통으로 다시 만드는 것의 의미 개최되는 단단하게 자궁에 있습니다. 간호사에서는 여자 및 유아 병원은 모든 전문가이며, 는 방법을 가르쳐 단단히 싸고 당신의 유아는 경우에 당신은 부탁드립니다.

그것을 기억하는 것이 중요 colic 하지 않는 을 방해하는 일반적인 성장과 건강의 기 조건 **임시**. 산 기 **좌절** 그들의 부모님과 누군가에서의 생활 가입니다. 나는 모든 사람에게 복통되지 않은 아기의 결함,그것은 당신의 잘못이 아닙니다,그리고 그들 얻을 것이다 그 —조만간입니다. 는 경우 배앓이가 실제 문제에 대한 당신 또는 당신의 유아 call 우리에게 약속입니다.

에 흠

아빠는,당신 너무 공유에서의 개발 니다. 휴식 **을 얻 참여**는 방법에 즐겁게 당신의 아들이나 딸입니다. 방법으로,우리는 당신이 시작하려면 지금 그 미래 개발 **Red Sox** 선수!

청소년 가정에서 느낄 수 있습니다 **위협** 나 **혼란** 로 새로운 경쟁니다. 이것은 정상적인,그리고 표시 로 반환을 치료하고,엄지손가락 빨,etc. 도 **호출 이전 어린이** 자주하는 동안 병원에 입원해 있습니다. 면 도착하는 가정의 아이가 아빠를 가져 에서 아기는 엄마에게는 30 분 정도의 전적인 관심을이다. 그것을 제공하는 데 도움이되 작은 선물들의 오래된 아이들이 그렇게 그들은하지 않는 잊혀지 — 무엇으로 선물의 모든 새로운 아기를 얻고 있다. 애완동물 수도 있습 질투의 새로운 침입니다. 야 **감독의 동물** 지 그것은 조정됩니다.

신생아가지 않은 면역을 모든 질병이 있습니다. 을 유지하려고 아 **서 군중**와에서 개인은 누구든지 있을 수 있습 a 차나 전염성이 있는 질병을 포함하여 모든 close-up 문의 모든 형제 자매님을 찬양하는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 동 유아의 처음 몇 주 동안 집에서 그들을 처리하기 먼저 **세척 그들의 손**. 간단한 비누와 물업 습니다.

유아용 침대

어떤 침대를 구입해야한 기준을 충족시키는 미국 소비자제품 안전위원회 확인 중고 있으며 신중하게 사용하기 전에 안전을 위한 회상한다. Rock&및 포장 및 재생지 인증으로는 아기 침대

침대 매트리스 야 방수과 **핏 단** 으로 침대 그래서 틈이 없 를 잡는 팔이나 다리합니다. **No 베** 해야 될 때까지 사용합니다. **를 사용하지 않는 범퍼 패드 느슨한 담요,박제 동물 또는 물침대** 침대에까지 아이는 여섯 개월 이상입니다. 에 차가운 밤 아기 잠에 장착 담요 잠옷입니다.

연구는 지금 보는 대부분의 경우 **SID** 나 **유아용 침대의 죽음**가 관련된 오래된 공기는 주변에는 아기의 코습니다. 이러한 이유로,항상 아기에 그 **다시 잠을** 을 위한 첫 번째 여섯 개월입니다. **우리는 강하게 조언에 대하여 아기에 부모님의 침대 이 될 수 있습니다 할 경우 위험한 엄마 또는 아빠니다.** 는 경우 가능한 시도 마을 아기 잠에서 별도의 용 침대 또는 basinette 에 위치한 당신의 침실을 위한 첫 번째 올해합니다. **실행 팬에 객실** 을 유지하는 공기 순환이지만,선풍기 하지 않아야에서 직접 지적하지 않는 한 아기가 실내 온도가 매우 따뜻한 있습니다. 의,과정, **마 을 허용하지 않는 흡연** 어디에서나 집니다. 마지막으로,사용 **고무 젓꼭지** 으로 아기가 다음과 같하여 위험을 줄일 수 있습니다.

일반적으로,곳에서 당신의 아기 침대 **줄리, 하지만 여전히 깨어.** 유아하는 것을 배워야 자신을 넣어. Failure 을 이 간단한 규칙에 따라 종종 결과에서는 나중 어려움을 받고 자기 자식이다. 대체 의 끝에 어린이 침대(왼쪽 또는 오른쪽)는 당신이 누워 아기의 머리로의 가능성을 줄일 을 개발하고 평평한 장소에 두개골이다.

옷

기억하기 **크 그들의 옷** 오래 전에 만들어지는 것입니다. 간단하,연약하고,빨,혈령한 옷가 최고입니다. 당신은 신속하게 발견하는 옷야 **기 고 기 쉬운 off.** 지 돈 불필요하게 비싼 옷 아나 아기 신발합니다. 이 나이에,싼 옷과 양말 는 최고입니다. 을 넣어 초과 돈을 절약할로 아이의 **대학금** —, 그 이 필요합니다.

심판 드레스의 유아는 방법으로 으로도 온도는 당신이 즉, **드레스 아기 같은 방법 당신이 자신을 드레스.** 겨울 동안에 넣 모 필요한 경우입니다. 좋은 붉은 발진 주변 간선(**가시 열**) 을 의미하는 유아왔 옷을 입고 너무 따뜻하게습니다.

깨끗한 모든 우유가 침대 옷과 **소 물**. 을 씻 아기 옷과 리넨에 중성 세제 등 Dreft 니다. 많은 세제와 첨가제가 될 수 있도 가혹한 아기에 대한 피부합니다. 를 사용하여 피 **직물 연화제 드라이어 트** 등으로 반송할 수 있기 민감한 화학 물질에 대한 그들입니다.

환경

을 유지하려고하는 **도 온도** 에서 아기의실이지만,또한 **팬 사용**하기 순환기에서 보육. 뜨거운 일에 제공 일부를 열어 환기에는 창입니다. 추운 날에 체크 때로는지 확인하는 유아 덮여 충분하다. 해야에서 보관 온도 편안한 나머지 가족합니다.

이 없는 집무할 때 이 아기가 자니다. **도 일반 잡음 준** 는 데 도움이 될 것이 신생아 수면상 하게 만들었습니다.

아이들은 가정에서 발생으로 흡연자가 높은 요금의 감기,천식,염니다. **흡연 금지** 어디에서나 집니다. 면 사람들이 해야 전체가 금연, 연에서만 외부 현관이나 뒤뜰에서습니다.

겨울 개월 동안 이 **저렴한 가습기** 또는 기화기 를 유지하는 데 사용되어야한다 일반 가정용 수분 수준을 유지하는 데 도움이 점액을 축축하고 막하지 않습니다. 을 놓지 않는 모든 의약품으로 가습기,하지만 씻고 그들을 주기적으로습니다.

욕조

아기야 **스폰지 목욕** 까지 사흘 후에 탯줄을 떨어졌 off 한 후,당신을 줄 수 있습니다 욕조에서 목욕 bathinette 또는 싱크습니다. 첫째,는지 확인 는 데 필요한 모든 것에 대한 목욕 **가록** 당신이 떠나지 않는 아기는 혼자서,목욕 **어**. 이것은 또한 없다는 의미에 대답하의 전화기 또는 초인종하지 않는 한 당신이 가지고 아기와 함께 당신!

를 사용하지 않는 스폰지 bathinette 그들이 할 수 있는 삽입 항구는 유해한 세균니다. **Dove 비누** 해야 사용 와 함께 미지근한 물입니다. 매일 목욕가 불필요 과 일으킬 수 있습니다 지나치게 건조한 피부합니다. 목욕 등의 첨가제 오일 및 거품 목욕을 피해야 합니다. **를 사용하지 않는 Q-tips** — 아무 것도 할 수 없 청소 모서리의 수건을 가치가 없 청소 및 위험할 수 있습니다.

야외에서

아기들 수 있습니다 일반적으로 가 어디든지 엄마 또는 아빠는,그러나이 일반적인 감각을 사용에 **균중을 피하고** 처음 몇 주 동안이다. A 좋은 엄지손가락의 규칙 아기 나올 때마다 날씨는 쾌적하다. 시간을 제한

야외에서 만 짧은 시간에 달합니다. A Snuggli 나 다른 아기를 들고 활용하지만 편리한다; 유지 아 줬을 때에는 몸이 따뜻함합니다.

자동차

그것은드 아일랜드는 법을 모두 미만의 어린이 네 살이나보십파운드에 타고해야합니다 는 승인된 자동차 **안전 좌석**. 승압기 좌석은 다음 필요할 때까지는 자녀에서 여덟 살입니다. 사 안전에 대한 좌석을 때 당신은 당신의 아기에서 흡으로 이동 병원도 있습니다. 신생아는 것이 자신의 자동차 좌석면 후니다. 이 **미국 아카데미 의 소아과, 소비자 보고서**고 다른 잡지에 정기적으로 평가 아이에 대한 자동차 좌석 안전과 가치입니다.

을 떠나지 않기에 무인 자동차습니다. 동 여름,자동차 인테리어 온도에 도달할 수 있는 수준 할 수 있는 빠르게 죽은 아이입니다. Pre-멋진 자동차,여름에 과 예열 자동차에서 겨울을 배치하기 전에 베 자동차 좌석입니다.

베이비 시터

항상 확인 베이비 시터의 **references** 훈련;지 않은 경우 신뢰하는 사람과 함께,당신의 차를 신뢰하지 않는 참석자 을 맡아 아기의합니다. 기본 **응급 처치**교육 할 수 있도 젊은 청소년들기 았아있다. 식에 익숙해지 참석자에서 당신의 존재를 떠나기 전에습니다. 인 화재 탈출 경로 어떤 잠재적인 문제 영역에서 사전니다. 는지 확인하 보기 위하여 알고 있는 다이얼을 911 을 얻을 불,경찰,구조 또는 서비스입니다. 마 정상 작동하는 연기 탐지기,당신은하지 않습니까? 맑 의 방향을 어떻게 귀하에게 연락할 수 있고,휴대 전화 숫자의 친척이나 친구만 경우에 당신은 할 수 없 에 도달했습니다.

육

할 수 있으면 집으로 새로운 유아보 작업,고려 자신을 매우 운이 좋다. 오늘의 세계 많은 엄마는 작업입니다. 하려고 전체 의 이점 **출산 남** 이 있습니다. 알고는 상관없이 무엇인 날료 배열,한 아이가 사랑하는 고 배려하는 부모 모두가 잘 될 것입니다.

의 계획을 가지고 무엇을 해야 당신의 아이가 병합니다. 그 불공정 자녀,그리고 다른 아이들을 보내기 **당신의 자녀가 보육 아픈 및 전염성**. 저장까지 모든 아프간을 위해 사용할 수 있는 자녀 때 그들은 아니다. 를 설정할 수도 있습 배열 중 당신의 친척이나 친구,동료기 때 았아 아이가 아픈입니다. 이 보스할 수 있습실 신의 선물이 될

을 것

저희 사무실에 전화 하루 당신은 모두 가정을 얻을 예약하려면 **첫 번째 방문**. 인 을 호출 고용주나 보험 회사 새로운 아기에 추가 **건강 보험** 계획 같은 날 당신 우리를 호출합니다.

Well-아이 방문을 시작 일주일 이내에 당신이 떠난 후에 병원이 더 많거나 적은 상황에 따라, 다시 후 다른 두 주니다. 예방 접종(아다)에서 시작 두 달을 방문합니다. 추가 잘 아기 방문 일반적으로 예약에서 네 가지를,여섯 개월 동안,다음 마다 세월의 나이까지 여덟 개월 오래 된다. 우리가 논하는 이 사진과 함께 사전에 당신 각각의 시간입니다.

리 **예상 통화** 부모로부터의 신생아,그래서 우리에게 전화 **943-7337**. 하기 액세스 더 육아 정보를 시도하십시오 링크에서 우리의 웹 사이트: **DrConcannon.com** 나 **DrVitale.com**. 궁금한 사항이 있는 경우 당사는 외부의 근무 시간 당신이 생각하는 **긴급** 때까지 기다릴 수 없 다음 날 **전화**니다. 우리의 응답 서비스는 것이 의사에게 문의하십시오,우리는 귀하의 전화를 가능한 한 빨리합니다. 하십시오 펜,종이,전화 번호 **약학** 한 때 우리는 전화합니다.

우리가 아픈 아이 적용을 배열과 여러 가지 다른 지역의 소아과 사용할 수 있는 논의 또는 당신의 아기는 다음날 아침이 필요한 경우입니다. **그래서, call us!**

면 귀하의 유아는 미만이고, **심각하게** **픈**하는 것이 좋습니다 당신의 아기를 **Hasbro**어린이 병원 소아과 응급실입니다. 후에 당신의 자녀입니다 한 살고,또는 더 적은 심각한 비상 사태,시급 치료 센터는 경험을 가진 아이들은 일반적으로,별금 등 **그냥 아이 RI** 아이가 **아픈 관리** 나 는 만큼 살아남기 위해 **시급한 관리**합니다.

을 읽어 주셔서 감사합니다 이 예약! **행운을 빕니다!**

